

# ブプレラム (ポプラリアン)

黄緑色の苞(ほう)が美しく、どんな切り花にも合うグリーン商材として人気がある。  
草姿は下部から分枝してスプレイ状になり、主にアレンジ用として扱われる

学名 *Bupleurum rotundifolium* セリ科  
和名 突き抜き柴胡(ツキヌキサイコ)  
原産地 ヨーロッパ、ロシア、イラン

特性・直根性で移植を嫌う1年草。高温多湿に弱い。  
開花特性・高温長日で開花促進  
収穫期・6~7月頃  
栽培環境・涼温で排水のよい土壌を好む

1坪あたりの植え付け本数・約85本/坪  
1株あたりの収穫本数・1本程度  
価格・カタログ参照



## 播種

播種時期・4~8月  
発芽条件・湿冷(涼)で休眠打破  
発芽適温・15℃  
発芽日数・催芽処理後3~7日  
※催芽処理は10~15℃の冷蔵庫内で7日間置く

## 定植

定植時期・5~9月  
定植間隔・株間条間15cm5条植  
畝・80cm  
ネット・12~15cm角1段  
マルチ・なし

## 肥料

元肥・N-P-K=0.8-1.0-0.6kg/a  
pH・6~6.6  
追肥・N-P-K= - - kg/a  
(極端な肥切れ以外は追肥しない)

## 作型

◆普通栽培・4~8月播種、5~9月定植、7~11月出荷。  
◆年内出荷・6月下旬~7月下旬播種、8~9月定植、11~1月出荷。10℃加温。8月下旬以降は要電照。

◆促成栽培・8月中旬~9月中旬播種、10月上旬~11月定植、1~3月出荷。定植1ヶ月後から電照。10℃加温。

## 病虫害

灰色カビ病(特に葉先枯れの部分から発生)  
アブラムシ、ハダニ

## 出荷

側枝が3~4本開花した頃が採花適期。  
早切りは水揚げが悪くなるので注意。

## 管理

生育適温15~20℃。  
冷涼な温度帯を好むので、出来るだけ25℃を超えないように管理する。  
種子寿命は約2年。  
低温期の播種は10℃を確保する。  
播種床の水はけが悪いと全く発芽しないことがあるため注意が必要。  
直根性で移植を嫌うため、直播か早期定植を心がける。  
電照は定植後15~30日頃を目安に行う。  
電照方法は日長延長16時間か暗期中断4時間。  
開花期に向けて徐々に水を切るが、極端な乾燥は葉先枯れを引き起こすことがある。葉先枯れから灰色カビ病の発生へとつながりやすいので、あらかじめ防除しておく。