

アスター *Callistephus chinensis*

ボブ スイートピンク

Domestic only Aster



販売品種

定植日：3月26日

早晩性：晩生

花色：明ピンク

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ 枝吹きよく、暖地の高温期開花でも性能が良い
- ・ ピンキーよりも発色は濃いめで、明るいピンク



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

24B.Dd pink

Domestic only Aster




試験品種

定植日：3月26日

早晩性：晩生

花色：くすみ系ピンク

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



・くすみカラーが秋出荷向き



MIYOSHI



24B.D Carmine


Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：濃ローズ

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



試験品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

播種 定植 開花 電照

- ・ 鮮やかなローズ色
- ・ 強日射下では花卉焼けが出る場合がある




MIYOSHI





早晩性：中晩生
花色　：くすみ系ローズ

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	硬	×	18h	なし



試験品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、
作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

🌱 播種 🌱 定植 🌸 開花 — 電照

- ・開花はやや早い
- ・やや茎が軟らかいため、締め気味の管理を推奨



アスター *Callistephus chinensis*

ボブサーモンオレンジ

Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：サーモンピンク

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	硬	×	18h	なし



販売品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ボブサーモンよりも黄色みが強いサーモンピンク
- ・生育後期、葉に茶褐色の障害が出やすい



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

ボブカスタード

Domestic only Aster



販売品種

定植日：3月26日

早晩性：晩生

花色：クリームイエロー

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	硬	×	18h	なし



草丈確保とチップバーン予防のため、

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

🌱 播種 🌱 定植 🌸 開花 — 電照

- ・マッシュイエローよりやや濃いめのイエロー
- ・花色特性でカビに弱いため、風通しを良くする



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

ボブディープブルー

Domestic only Aster



販売品種

定植日：3月26日

早晩性：晩生

花色：濃ブルー

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



草丈確保とチップバーン予防のため、

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

🌱 播種 🌱 定植 🌸 開花 — 電照

- 他の花とも合わせやすい濃すぎないブルー
- やや花首が細い傾向にあるため、硬く締める管理を推奨



アスター *Callistephus chinensis*


ボブ シルバーブルー

Domestic only Aster



早晩性：晩生
花色　：ホワイト/淡ブルー

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	硬	×	18h	なし



販売品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、 播種 定植 開花 電照
作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・これまでのアスターにはない爽やかな淡いブルーとホワイトのグラデーションカラーが印象的な品種
- ・樹勢がつくと花が歪むことがあるので注意



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*


ボブ パープルアッシュ

Domestic only Aster



早晩性：晩生
花色　：くすみラベンダー

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	硬	×	18h	なし



販売品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、 播種 定植 開花 電照
作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ニュアンスカラーが目を引くラベンダー系品種
- ・揃いが良く、露芯しにくい



MIYOSHI




24B.WhiteR

Domestic only Aster



早晩性：中晩生
花色：淡ライトピンク

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



試験品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、 播種 定植 開花 電照
作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・開花は大輪系の中でも早い
- ・やや花卉が少なく、咲き進むと露心しやすい



アスター *Callistephus chinensis*

マッシュ ラベンダー

Domestic only Aster



早晩性：晩生
花色：ラベンダー

イチ
押し

花径	草丈	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7-9cm	80cm	普通	×	18h	なし



販売品種

定植日：3月26日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- 他のマッシュ系に比べて大輪に仕上がる
- 草丈はとりやすいが、分枝はやや少なめ



MIYOSHI



スフレライトピンク



Souffle Light Pink



早晩性：中生

花色：ライトピンク

NEW

イチ
推し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7 - 9	80	普通	×	16h	×

新品種


定植日：4月3日

- ・ ミヨシ育成オリジナル大輪品種
- ・ 艶やかな優しい桜ピンクの花色が特徴
- ・ 葉焼け防止のため、電照栽培推奨
(他の大輪系と合わせて18時間設定とする場合、
花芽が付く頃に電照は切る方がよい)
- ・ 大輪ボブ系と同様の栽培管理が望ましい



MIYOSHI





新品種

定植日：4月3日

早晩性：中生

花色：赤

NEW

イチ
推し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
7.5-8	90-105	普通	×	16h	×


- ・ミヨシ育成オリジナル大輪品種
- ・耐病性あり(連作圃調査)
- ・花弁にやや白が入り、グラデーションになる
- ・高温強日射下では色目特有の色褪せが出ることがあるため、遮光が必要
- ・葉焼け防止のため、電照栽培推奨（16時間でOK）
- ・大輪ボブ系と同様の栽培管理が望ましい



MIYOSHI



21-216



試験品種

定植日：4月3日

早晩性：早生

花色：ピンク

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
8	—	普通	○	18h	×

- ・マカロンよりやや遅い早晩性
- ・露芯しにくく頂点で花が揃うタイプ
- ・露地でも栽培できる中大輪タイプ



MIYOSHI



22-213



試験品種

定植日：4月3日

早晩性：中晩生

花色：ローズ

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
8	—	普通	○	18h	×

- ・ 21-216より花弁枚数少なめだが、草丈は取れる
- ・ 露地でも栽培できる中大輪タイプ



MIYOSHI





試験品種

定植日：4月3日

早晩性：中晩生

花色：ラベンダー

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
6	—	普通	○	18h	×

- ・ 21-216より花弁枚数少なめ
- ・ 丈は他2系統(22-13・21-16)の中間値
- ・ 露地でも栽培できる中大輪タイプ



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

マカロンピンク



Macaroon Pink

登録品種名：ミヨアスマカピンク
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



早晩性：早生
花色：ピンク



花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2

販売品種

定植日：4月10日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

播種 定植 開花 電照

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では開花は早めで丈が取りやすい
- ・ローズよりも落ち着いたキュートなピンク品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンローズ



Macaroon Rose



早晩性：早生
花色：濃ピンク

イチ
押し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2

販売品種 (25年9月より再販予定)

定植日：4月10日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

播種 定植 開花 電照

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では開花は早めで丈が取りやすい
- ・花中心部に白と黄色が入り、花色が可愛らしい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンスカーレット



Macaroon Scarlet

登録品種名：ミヨアスマカスカーレット
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



早晩性：早生

花色：紅

イチ
推し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2

販売品種

定植日：4月10日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨



播種



定植



開花

電照

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では若干丈がとりずらい傾向
- ・鮮やかな赤で、花色のコントラストが美しい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンバイオレット



Macaroon Violet

出願中NO.35819につき営利目的の増殖はご遠慮ください。



早晩性：早生

花色：濃紫

イチ
推し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
											
											
											
											

販売品種

定植日：4月10日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

 播種  定植  開花  電照

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では抽苔が遅くボリュームが取りやすい
- ・シリーズ内、最も晩生で草丈が取りやすい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

マカロンブルー

Macaroon Blue



早晩性：早生
花色：明ブルー

イチ
押し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2

販売品種

定植日：4月10日

播種 定植 開花 電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・洋花アレンジにも適した爽やかなブルー



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

マカロン ディープブルー

Macaroon Deep Blue



早晩性：早生
花色：濃ブルー

イチ
推し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
											
											
											
											

販売品種

定植日：4月10日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

 播種  定植  開花  電照

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・ブルーとバイオレットの中間となる品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロン ホワイト



Macaroon White

品種登録名 MYAST003
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



販売品種

定植日：4月10日

早晩性：早生

花色：白

イチ
押し

花径 (cm)	草丈 (cm)	茎の硬さ	露地	電照	ピンチ
5	60-70	硬	○	16h	×

3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2



播種



定植



開花

電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・純白な花弁に中心イエローのコントラストが美しい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。