

FT1 耕種概要

品目名：ユーストマ

定植日	1/30(晩生～中晩生)、2/13(中晩生～中生) 2/19(中生)、2/27(早生)
加温	18℃加温(実温15～16℃)→15℃(3/31)→14℃ (5/12)
換気 (定植～)	サイド23℃、天窓25℃
肥料設定 (全体使用量)	ハイコントロール085 (70日タイプ) ハイコントロール085 (180日タイプ) ハイコントロール085 (360日タイプ) 各ベンチにそれぞれ360g
定植密度	12cm×7目 両サイド・中央1条あけの4条植え
定植後の管理	定植～2週間まで手灌水 週2回液肥 (4/2まで) ※ピータース20-20-20 3000倍 (約84～85ppm) 4/2以降、毎日自動散水 (液肥灌水) (18000倍：毎分 7 L/ベンチ 5分間) ※施用時間は9:30～、13:30～
仕立て方	一枝一花一蕾 ※品種により適宜

FT1 耕種概要

品目名：ダリア

定植日	4/30(晩生～中晩生)、5/8(中晩生～中生) 5/12(中生)、5/20(早生)
加温	18℃加温(実温15～16℃)→15℃(3/31)→14℃ (5/12)
換気 (定植～)	サイド23℃、天窓25℃
肥料設定 (全体使用量)	ハイコントロール085 (70日タイプ) ハイコントロール085 (180日タイプ) ハイコントロール085 (360日タイプ) 各ベンチにそれぞれ360g
定植密度	20cm×4目 1条ちどり植え 3寸ピンチポット定植 (鉢上げ後1か月程度ポット管理)
定植後の管理	定植～散水のみ
電照	定植開始～5月26日 (暗期中断：日長14.5H設定)

FT1 耕種概要

品目名：ケイトウ

定植日	久留米ケイトウ・羽毛ケイトウ：4月30日 トサカケイトウ：5月8日
加温	18℃加温(実温15～16℃)→15℃(3/31)→14℃ (5/12)
換気 (定植～)	サイド23℃、天窓25℃
肥料設定 (全体使用量)	ハイコントロール085 (70日タイプ) 各ベンチにそれぞれ360g
定植密度	10cm×8目 中二条抜き
定植後の管理	定植～散水のみ
電照	定植開始～5月26日 (暗期中断：日長14.5H設定)

FT2 耕種概要

品目名：ダイアンサス

定植日	3/13 (全品種)
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	20cm×4目 4条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 3月18日 ライゾー使用（5000倍） 4月4日～晴天時に週1回ポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 4月24日 6～7節残しでピンチ 4月29日～晴天時に週1回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：キンギョソウ (一重・八重)

定植日	1回目定植 4/25 2回目定植 5/8
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	10cm×8目 中2条空けの6条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 5月14日 ポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 5月19日～ 晴天時に週1～2回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：レピディウム、オキシペタラム、プチロータス

定植日	全品種 4/25
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	12cm×7目 株間24cm4条植え、24cm千鳥3・4条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 5月7日 ポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 5月14日～30日 レピディウムを期間内で1回ピンチ 5月15日～ 晴天時に週1回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：マリーゴールド、ジニア

定植日	マリーゴールド定植 4/25 ジニア定植 5/8
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	20cm×4目 4条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 5月7日 マリーゴールドにポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 5月14日 両品目にポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 5月19日～ 晴天時に週1回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：アスター (導入系、オリジナル系)

定植日	ベッド7 (ボブ・マッシュシリーズ) 3/26 ベッド8 (スフレッシュシリーズ・試作系統) 4/3 ベッド8 (マカロンシリーズ) 4/10
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N: 0.3kg P: 0.3kg K: 0.3kg
定植密度	12cm×7目 中1条空けの6条植え
定植後の管理	定植後は、活着 (1～2週間) まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 4月4日 導入系にポリフィード使用 (17 - 17 - 17、1000倍) 4月24日 ポリフィード使用 (17 - 17 - 17、1000倍) 4月29日～晴天時に週1～2回ピータース使用 (20 - 20 - 20、3000倍) 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：スターチス シニユアタ

定植日	4/1
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウン ジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	40cm×2目 2条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 4月24日 ポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 4月24日～5月14日まで株づくりのピンチ 4月29日～ 晴天時に週1～2回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：ハイブリッド スターチス

定植日	ブリスイエロー 3/13 その他品種 4/1
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウン ジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	40cm×2目 2条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 4月4日 ブリスイエローにポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 4月14日 動きが鈍い株にライゾー使用（5000倍） 4月24日 ポリフィード使用（17 - 17 - 17、1000倍） 4月29日～ 晴天時に週1回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍） 曇天が2日以上続く場合は、ホストップ1000倍を葉面散布

FT2 耕種概要

品目名：ヒマワリ

定植日	ダージリン1回目定植 5/8 ダージリン2回目定植 5/14 東北八重・レモネード1回目定植 5/16 東北八重・レモネード2回目定植 5/20 プロカットシリーズ・グリーンバースト1回目定植 5/30 プロカットシリーズ・グリーンバースト2回目定植 6/3
肥料設定 (元肥)	ミスターブラウンジャスミックス (6-6-6-苦土1) 1aあたり N：0.3kg P：0.3kg K：0.3kg
定植密度	10cm×8目 外1条空けの中6条植え
定植後の管理	定植後は、活着（1～2週間）まで手灌水。以降はストリームラインで灌水。 5月19日～晴天時に週1回ピータース使用（20 - 20 - 20、3000倍）